

## 洗腎瘻管氣球擴張手術衛教單張

### 術前準備

1. 徹底清潔雙手及手臂
2. 按時服用平日的慢性病藥物
3. 血壓和體溫若有異常請告知醫護人員
4. 有疑問請當天手術前提問

### 術中進行

1. 採取局部麻醉，可正常進食
2. 通常有 1-2 個打針穿刺傷口
3. 當血管成形氣球將病灶處撐開時會有一定程度的痠痛
4. 當氣球擴張效果不佳時可能需要放血管內支架
5. 以上依個人情況有所不同

### 術後照護

1. 傷口勿碰水保持乾燥，直到第一次回診前不需換藥
2. 若有縫線，縫線 24 小時後可拆除
3. 術後 24 小時後患肢可以開始握球運動，每天握 500 次以上
4. 若患肢有滲血不止、化膿、手指發紺、疼痛情況立即就醫

### 可能發生合併症

1. 傷口感染
2. 傷口出血不止或血腫瘀青
3. 人工血管感染
4. 術後血管栓塞導致阻塞或血管破裂需再次手術
5. 術後血管病灶馬上回縮
6. 手指冰冷、手指發紺、疼痛或痲痹等缺血症狀
7. 顯影劑過敏（發癢、起疹、呼吸困難、休克等）



關懷專線：0975425034

血管通路知識網：<http://www.access-health.net>

長庚紀念醫院血管介入團隊：<http://www.envita.site/>