

洗腎瘻管氣球擴張手術衛教單張

術前準備

1. 徹底清潔雙手及手臂
2. 按時服用平日的慢性病藥物
3. 血壓和體溫若有異常請告知醫護人員
4. 有疑問請當天手術前提問

術中進行

1. 採取局部麻醉，可正常進食
2. 通常有 1-2 個打針穿刺傷口
3. 當血管成形氣球將病灶處撐開時會有一定程度的痠痛
4. 當氣球擴張效果不佳時可能需要放血管內支架
5. 以上依個人情況有所不同

術後照護

1. 傷口勿碰水保持乾燥，直到第一次回診前不需換藥
2. 若有縫線，縫線 24 小時後可拆除
3. 術後 24 小時後患肢可以開始握球運動，每天握 500 次以上
4. 若患肢有滲血不止、化膿、手指發紺、疼痛情況立即就醫

可能發生合併症

1. 傷口感染
2. 傷口出血不止或血腫瘀青
3. 人工血管感染
4. 術後血管栓塞導致阻塞或血管破裂需再次手術
5. 術後血管病灶馬上回縮
6. 手指冰冷、手指發紺、疼痛或痲痺等缺血症狀
7. 顯影劑過敏（發癢、起疹、呼吸困難、休克等）

關懷專線：0975425034

